

ZZOZ im. Jerzego Pióro w Dobrym Mieście ul. Grunwaldzka 10 B 11-040 Dobrze Miasto	GASTROSKOPIA (informacja o badaniu i zgoda na jego wykonanie)	Edycja 2024 Strona 1/2
--	--	-------------------------------

Gastroskopia jest najskuteczniejszą metodą diagnostyczną polegającą na oglądaniu wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, dwunastnicy) za pomocą elastycznego endoskopu wprowadzanego przez usta pacjenta. Metoda ta pozwala na wykonanie dodatkowych badań (np. test w kierunku *Helicobacter Pylori*, badanie histopatologiczne).

Możliwe jest też leczenie niektórych chorób bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego (np. podwiązanie żyłaków przełyku, usunięcie polipów, tamowanie krwawienia).

Przygotowanie do badania

Przed badaniem pacjent nie powinien nic jeść przez co najmniej 6 godzin i pić przez co najmniej 3 godziny. Nie dotyczy to leków przyjmowanych na stałe, należy je przyjąć i popić niewielką ilością niegazowanej wody. Zaleca się odstąpić od palenia papierosów.

Ze względów bezpieczeństwa przed badaniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Przeprowadzenie badania

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na lewym boku. Bezpośrednio przed badaniem podaje się znieczulenie miejscowe gardła. Powoduje to zniesienie nieprzyjemnych odruchów. Pacjent powinien spokojnie oddychać i powstrzymać się od przełykania śliny. W trakcie całego badania pacjent trzyma w ustach specjalny ustnik, przez który wprowadza się giętki gastroskop, ten moment może być nieprzyjemny i wymaga współpracy pacjenta z lekarzem wykonującym badanie. Oglądanie wnętrza górnego odcinka przewodu pokarmowego trwa zwykle kilka minut, jest w niewielkim stopniu nieprzyjemne i w zasadzie bezbolesne, podobnie jak pobieranie wycinków jałowym instrumentem. Narzędzia do pobierania wycinków lub usuwania polipów są sterylne, co chroni przed zakażeniem.

Postępowanie po badaniu

Po badaniu przez krótki czas będziemy odczuwać dyskomfort w gardle, który ustępuje samoistnie. Ze względu na znieczulenie miejscowe gardła nie należy jeść ani pić przez około godziny po badaniu, aby uniknąć zachłyśnięcia. Wszelkie niepokojące dolegliwości należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi.

Możliwe powikłania

Powikłania po gastroskopii zdarzają się niezwykle rzadko (0,08%) ustępują samoistnie i zazwyczaj nie wymagają żadnego leczenia, częściej dotyczą pacjentów z licznymi chorobami towarzyszącymi. Zaliczamy do nich krwawienia z miejsca pobranych wycinków, drobne uszkodzenia śluzówki, perforacja przewodu pokarmowego, zaostrzenie astmy oskrzelowej.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo do minimum prosimy odpowiedzieć na następujące pytania:

1	Czy istnieje zwiększona skłonność do krwawień i siniaków przy urazach mechanicznych?	TAK / NIE
2	Czy występowały objawy uczulenia na środki spożywcze lub lecznicze?	TAK /NIE
3	Czy stosowane są leki wpływające na krzepliwość krwi (np. sintrom, warfin, acenocumarol itp.) ?	TAK /NIE
4	Czy są poważne schorzenia serca, układu krążenia lub układu oddechowego?	TAK /NIE

Nazwisko i imię

Pesel

Oświadczenie pacjenta:

Oświadczam, że:

- stwierdzam, że uzyskałam/uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania
- zapoznałam/łem się ze szczegółowym opisem badania, jego celowością i oczekiwanym wynikiem oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w wyniku w/w badania i zgadzam się na proponowane badanie;
- w pełni zrozumiałem informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy z lekarzem;
- zgadzam się również na ewentualne zmodyfikowanie sposobu badania w niezbędnym zakresie (w tym m.in. na zabieg pobierania wycinków i zabieg polipektomii, zabiegi operacyjne w przypadku wystąpienia powikłań przetoczenia krwi), jeżeli sytuacja by tego wymagała, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej;
- wyrażam również zgodę na znieczulenie lub sedację dożylną, jeżeli będą potrzebne do przeprowadzenia badania endoskopowego.

.....
Podpis badanego lub opiekuna prawnego.....
Data i podpis lekarza**Uwaga:**

Jeżeli zabieg endoskopowy wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu ogólnym, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych w tym dniu i konieczna jest opieka drugiej osoby. Po zabiegu endoskopowym bez znieczulenia ogólnego nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych bezpośrednio po jego wykonaniu.